



Serviciile SAJ Vrancea se acorda in baza Normei metodologice din 20/12/2011 cuprinzând Anexele nr. 1-40 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

1. **URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE**
2. URGENTE DE GRAD 2
3. TRANSPORT SANITAR
4. CONSULT SI TRATAMENT LA DOMICILIU
5. SERVICII LA CERERE SI CONTRACOST

MANUAL Prim ajutor:

https://docs.google.com/file/d/0B_GbpwP6Vlj8bXZEOEtxd205ZG8/edit?pli=1

ANEXA Nr. 21

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE

în asistența medicală de urgență și transport sanitar

CAPITOLUL I

Pachet de servicii medicale de bază în asistența medicală de urgență și transport sanitar

A. Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale majore (cod roșu) decontate de casele de asigurări de sănătate:

1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

a. mama este inconștientă

b. mama prezintă convulsii

c. tegumentele mamei sunt reci și umede, stare de leșin (insuficiență cardiovasculară)

d. nou-născutul nu plânge/respiră

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie

f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcina

g. contracții uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină

h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină

i. membrane rupte sau senzația mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspionat a fi în poziție anormală

j. pacientă inconștientă cu probleme ginecologice/obstetrice

k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice

l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă

m. sângerare, paloare, transpirație sau aproape de sincopă

n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracții sau sângerare

o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni

p. contracții puternice între săpt. 20-36 de sarcină

q. durere și sângerare (în cantități mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină

r. convulsii în timpul sarcinii

2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ

a. inconștiență

b. nivel scăzut de conștiență

c. dificultate serioasă în respirație

d. tegumente palide și umede, aproape sincopă

e. pacient slăbit cu durere toracică

f. durere toracică și greață

3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE

- a. suspiciunea mai multor victime grav afectate

- b. inconștient, după arsură termică/electrică

- c. nivel scăzut al conștienței după arsură termică/electrică

- d. dificultăți în respirație după arsura termică/electrică

- e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum

- f. mai mult de 20% suprafață arsă suspionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/față (adult)

- g. mai mult de 10% suprafață arsă suspionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/față (copil sub 10 ani)

- h. suspiciune de arsuri severe, informații incerte

- i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt

- j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspionate

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ

a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute

b. imersie în apă confirmată, inconștient

c. imersie în apă cu dificultăți în respirație

d. victimă aflată încă în apă

e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut

f. accident prin săritură în apă

g. leziune extinsă și imersie în apă

h. suspiciune de hipotermie

i. dezorientat/confuz, fără dificultăți în respirație

j. tuse severă posibilă aspirație

5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE

- a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute

- b. victimă aflată încă în apă

- c. inconștient după scufundare

- d. tegumente reci și umede, aproape sincopă

- e. confuz sau agitat după scufundare

- f. paralizie sau amețeli în diferite părți ale corpului

- g. leziuni extinse vizibile

- h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă

- i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conștiență, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente)

6. MUȘCĂTURI DE ANIMALE/ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE

- a. inconștient

- b. dificultăți în respirație

- c. tegumente palide și umede, aproape sincopă

- d. mușcătură de viperă cu simptome generale

- e. mușcătură de viperă la copil mic

- f. hemoragie necontrolată după mușcătură

- g. înțepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil

7. CĂDERI ȘI ALTE ACCIDENTE

- a. susp. mai multe victime grave

- b. susp. inconștient în urma accidentului

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

c. greutate la respirație în urma accidentului

d. starea de conștiență în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită

e. paralizie

f. paloare, transpirații, aproape inconștient

g. sângerare necontrolabilă

h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei

i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părți ale corpului

j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului

k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor

l. pacient carcerat, blocat etc.

m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgență

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

n. susp. de traumatism prin energie mare, informații neclare

o. dureri precordiale pre-existente, amețeli acute, cefalee, diabet

p. dureri mari (fără alte criterii de urgență)

8. INTOXICAȚII, COPII

a. inconștient în urma intoxicării

b. dificultăți în respirații relatate la intoxicație

c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce

d. greutate în deglutiție în urma intoxicației

e. paloare, transpirații și obnubilare

f. convulsii în urma intoxicației

g. informații neclare despre substanțe și simptome

9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEȚEI ȘI ALE GÂTULUI

- a. inconștient mai mult de 5 minute

- b. dificultăți în respirație în urma unui traumatism cranian

- c. nivelul conștienței în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită

- d. pacient neliniștit, confuz, necontrolabil sau agresiv

- e. traumă craniană și convulsii

- f. traumă craniană și paralizie

- g. palid, transpirat, obnubilat

- h. strivire sau plagă penetrantă a feței, mandibulei sau a gâtului

- i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

j. pacient carcerat sau blocat

k. accident forestier

l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgență

m. suspect traumă indusă prin energie mare, informații neclare

n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie

o. dureri intense nesuportabile

10. HIPO-HIPERTERMIA

a. dificultate în respirație cu hipotermie

b. neliniștit, confuz sau necooperant cu hipo-hipotermie

c. alte leziuni extinse cu hipotermie

d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade

e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie

11. INCIDENT MAJOR

a. incendiu - Explozie

b. prăbușire de avion

c. accident de tren - tram.

d. accident rutier

e. dezastru natural

f. scăpări de gaze

g. accident naval

h. atac terorist, război

i. alte dezastre

j. posibile dezastre sau accidente în masă

12. LEZIUNI CHIMICE

a. susp. multiple victime

b. inconștient în urma leziunilor chimice

c. nivelul de conștiență scăzut în urma accidentului chimic

d. greutate în respirație în urma incidentului chimic

e. dificultate în respirație în urma accidentului chimic

f. palid, transpirat, aproape inconștient

g. peste 15% suprafață leziuni cu subst. corosivă la adult

h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

i. ingestie de subst. alcaloidă la copii

j. susp. de leziuni grave. Nu avem informații clare

k. incident major

l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată

m. accident cu subst. hazardoase implicate

n. ingestie de substanțe caustice, antigel, organofosforice

13. ACCIDENT RUTIER

a. susp. multiple victime cu leziuni serioase

b. inconștient în urma accidentului

c. dispnee în urma accidentului

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

- d. stare de conștiență în scădere sau obnubilare prelungită
- e. traumă craniană cu neliniște, agresiv sau convulsii
- f. palid, transpirat obnubilat
- g. paralizie în urma accidentului
- h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei
- i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părți ale corpului
- j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului
- k. victimă blocată
- l. susp. traumă prin energie mare, informații neclare
- m. accident cu substanțe chimice periculoase
- n. dureri precordiale, amețeli, cefalee, diabet preexistent
- o. a fost inconștient dar acum este bine și fără alte criterii de urgență

p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgență

14. VIOLENȚĂ; AGRESIUNE

a. suspect de afecțiuni severe

b. inconștient după violență

c. Dispnee după violență

d. nivel scăzut al stării de conștiență

e. leziuni la nivelul extremității cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm

f. leziuni la nivelul capului și convulsii

g. paralizie după violență

h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpirații, aproape de sincopă

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei

j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului

k. leziuni severe suspecte, informații neclare

15. ALERGII

a. inconștient după reacția alergică

b. reacție alergică imediată cu dificultăți respiratorii

c. reacție alergică, dificultăți la vorbire și decluțiție

d. reacție alergică, edem glotic

e. rece și transpirat, aproape de sincopă

f. simptome imediate, antecedente de șoc anafilactic

16. SINCOPA

- a. Inconștient, obnubilat
- b. inconștient, respirație anormală
- c. căderea nivelului de conștiență sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conștienței
- d. antecedente neclare de boală sau inconștiență
- e. aproape de sincopă, palid și transpirat
- f. cefalee intensă acută anormală, pierderea stării de conștiență
- g. diabetic cunoscut aflat în stare de inconștiență
- h. sângerare nedatorată unui traumatism, pierderea stării de conștiență

17. SÂNGERAREA

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

- a. inconștient și sângerează, cauză netraumatică

- b. dispnee și sângerare, de cauză nontraumatică

- c. aproape de sincopă, palid și transpirat

- d. hematemeză, palid și transpirat

- e. scaune închise la culoare și tare, pacient transpirat, palid

- f. sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare semnificativă

- g. sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare (cantități mici sau mari însoțite de durere)

- h. sângerare masivă necontrolată

18. DURERI TORACICE

- a. inconștient după durere toracică

- b. dispnee și durere toracică

c. durere toracică tipică în infarctul de miocard

d. durere toracică, palid și transpirat

e. durere toracică aproape de sincopă

f. suspectarea unor probleme cardiace severe, persoana care face apelul nu se află lângă pacient

19. DIABET ZAHARAT

a. cunoscut diabetic aflat în stare de inconștiență

b. diabetic cunoscut, dispneic

c. diabetic cunoscut, prezintă convulsii

d. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe

20. TEMPERATURĂ

- a. inconștient, temperatură crescută

- b. pacient slăbit, temperatură și dispnee marcată

- c. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită

- d. pacient slăbit, temperatură, dificultăți la deglutiție și sialoree (suspect epiglotită)

21. AVC (APOPLEXIE)

- a. inconștient, suspect de AVC

- b. dispnee suspect AVC

- c. convulsii prezente, suspect AVC

- d. inconștient mai mult de 20 min.

- e. perioadă lungă cu nivel scăzut al conștienței, simptomele apoplexiei

f. cefalee bruscă, intensă (violentă)

g. traumatism cranian recent, simptome de apoplexie

22. CEFALEE

a. pacient inconștient cu cefalee care a precedat starea de inconștiență

b. cefalee și dispnee marcată

c. cefalee și scăderea nivelului de conștiență

d. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăți de vorbire

e. cefalee și temperatură mare, redoare de ceafă, slăbiciune, posibil eritem

f. cefalee severă și convulsii

23. CONVULSII

- a. nu respiră normal după convulsii

- b. convulsii pentru prima oară, inconștient

- c. convulsii în derulare, mai mult de 5 min.

- d. pacient obnubilat între convulsii frecvente

- e. obnubilat 20 de min. după convulsii

- f. însărcinată cu convulsii

- g. diabetic cu convulsii

- h. convulsii după leziune craniană recentă

- i. convulsii în derulare, concomitent supradoză de medicamente

- j. convulsii în derulare, concomitent abuz de narcotice

- k. eritem, febră și convulsii

24. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE

- a. inconștient după criză de dureri abdominale sau de spate

- b. dispnee cu durere abdominală sau de spate

- c. aproape sincopă, nivel scăzut de conștiență

- d. durere intensă abdominală sau de spate, palid și transpirat sau aproape de sincopă

- e. pacient peste 50 de ani cu debut brusc

- f. vomită sânge, palid și transpirat sau aproape de sincopă

- g. scaune tari și închise la culoare, palid și transpirat sau aproape de sincopă

- h. femeie, însărcinată cu dureri abdominale acute, în flancul inferior

- i. palid și transpirat sau aproape de sincopă

25. PSIHIATRIE/SUICID

- a. inconștient după tentativă violentă de suicid
- b. inconștient, obnubilat după supradoză/intoxicație
- c. dispnee (fără suspiciune de hiperventilație)
- d. cel care sună sau aparținătorii se simt amenințați de pacient
- e. tentativă serioasă cu violență de suicid
- f. supradoză/intoxicație sau simptome serioase

26. DISPNEE (DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE)

- a. inconștient nu respiră normal
- b. pacient slăbit, dispnee

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

- c. palid și slăbit, aproape de sincopă
- d. dispnee, dureri toracice constrictive
- e. criză de astm, nu se îmbunătățește starea cu medicație
- f. dispnee, nu poate vorbi coerent
- g. copil sub 12 ani, în poziție șezândă, cianotic
- h. slăbit, pacient febril cu dificultăți la înghițire sialoree (suspect epiglotită)
- i. suspect de corp străin în gât, nu poate vorbi, tușește sau plânge
- j. leziuni la nivelul toracelui și dispnee
- k. dispnee moderată - persoană care a născut recent, fractură recentă, membru cu aparat gipsat, spitalizare recentă

27. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAȚIE

- a. inconștient, obnubilat după stare de ebrietate/intoxicație

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

- b. dificultăți respiratorii după stare de ebrietate/intoxicație
- c. persoană care face apelul/aparținătorii se simt amenințați
- d. supradoză/intoxicație și simptome critice
- e. palid și transpirat aproape de sincopă
- f. convulsii care durează mai mult de 5 min.
- g. cocaină sau crack cu dureri toracice
- h. intoxicație și suspiciunea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului)

28. COPIL BOLNAV

- a. inconștient, obnubilat (fără convulsii febrile)
- b. nu respiră

Urgente grad 1

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

- c. copil slăbit cu dispnee

- d. suspiciune de corp străin în gât, nu poate vorbi sau plânge

- e. slăbit, copil febril, dificultăți la deglutiție, sialoree (posibil epiglotită)

- f. copil slăbit și iritabil, febră (meningită sau septicemie?)

- g. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min.

- h. pacient obnubilat după 20 de minute, sau se suspectează convulsii febrile

29. URECHEA

- a. inconștient, nu respiră normal

- b. leziune la nivelul urechii, nivel al stării de conștiență scăzut

- c. amețeală, nivel scăzut al stării de conștiență

- d. amețeală, paralizie

e. amețeală, dureri toracice

f. amețeală, palid și transpirat

30. OCHIUL

a. inconștient după ce a acuzat probleme de vedere

b. dispnee și tulburări ale vederii

c. inconștient mai mult de 5 minute după producerea leziunii

d. leziune a ochiului și scăderea nivelului stării de conștiență {jcomments off}